Climat et effets locaux

Climat de la France

Un peu de climatologie générale...

- Mais auparavant, une première carte météorologique : Pmer moyenne annuelle
- On retrouve en moyenne :
 - Un anticyclone (A) vers les Açores
 - Une dépression (D) vers l'Islande
- Et de quelle direction vient donc le vent (et donc les systèmes météorologiques) en moyenne ?
- Loi de Buys Ballot : le vent
 - Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un anticyclone
 - Tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'une dépression
- On parle de géostrophisme : équilibre entre les forces de pression et la force de Coriolis
- En conséquence, la France est en moyenne sous l'influence de courants d'ouest.

Un peu de climatologie générale...

- Maintenant, un peu de géographie

Un peu de climatologie générale...

- A l'ouest (au sens large), l'océan atlantique : influence maritime (+présence du Gulf Stream)
 - Effet tempéré : hiver doux et été frais
 - Humidité : précipitations régulières
- A l'est, le continent eurasiatique
 - Hivers froids
 - Étés chauds
 - Maxi de pluie estival
- Une barrière de montagnes des Pyrénées au Massif Central et aux Alpes
- Des régions « abritées » de ces influences autour de la Méditerranée
 - Été chauds et secs
 - Hivers doux
 - Fortes pluies aux saisons intermédiaires (surtout automne)

Un peu de climatologie générale...

- Carte synthétique des climats en France

Climat océanique

- On va construire le climatogramme de Brest

Climat océanique dégradé

- On parle aussi de climat parisien d'un côté et climat aquitain de l'autre.
- On va construire le climatogramme de Paris Montsouris

Climat semi-continental

- On va construire le climatogramme de Strasbourg

Climat méditerranéen

- On va construire le climatogramme de Marseille (Marignane)

Et le climat de montagne ?

- Premier point : gradient vertical moyen de température ?
-0,65°C/100m
- Climat considérablement influencé par le versant : ubac, adret, au vent et sous le vent
 - Cela sera développé dans la partie consacrée aux phénomènes locaux
- En plaine de montagne, on peut faire l'analogie avec le climat continental :
 - Forte amplitude de température quotidienne et annuelle (avec des matinées froides en toute saison)
 - Précipitations estivales au caractère orageux
 - Particularité des versants méditerranéens (fort ensoleillement par abri du courant océanique)

Climat d'une station

Météo à l'École

Par souci de temps, on va réaliser la climatologie (Tmin, Tmax, Tmoy, RR) pour le seul mois de février

Comparaison avec les « normales clim »

- Carte Tmoy, Tn moy et Tx février
- Carte RRmoy février

Comparaison avec les « normales clim »

- Conclusion avec le doc de la DCLIM

Comparaison avec les « normales clim »

- Au sens de l'OMM, le terme de « Normales » désigne des moyennes de variables climatiques (et par extension d'autres quantités statistiques) sur des périodes longues, comprenant au moins trois décennies consécutives (WMO, Technical Regulations WMO No 49 Vol. I).
- Parmi elles, les « Normales climatologiques standards », désignent des statistiques sur des périodes successives de 30 ans. La période actuellement en vigueur est 1961-1990, la prochaine sera 1991-2020.
- Cependant, la réactualisation tous les 30 ans pose des questions de représentativité de ces
- périodes dans un climat non stationnaire.
- De nombreux services météorologiques calculent donc des normales sur des périodes de 30 ans tous les 10 ans.
- On trouve indifféremment le qualificatif « climatologique » ou « climatique ».

Normales clim

températures

Tn moyenne annuelle

Moyenne annuelle de référence 1971–2000 de la température minimale
France

Tx moyenne annuelle

Moyenne annuelle de référence 1971–2000 de la température maximale
France

Tn janvier

Moyenne mensuelle de référence 1971–2000 de la température minimale
Janvier – France

0°C à Lyon
2°C à Paris, Toulouse
Poche plus froide sur
les Landes

Tx janvier

Moyenne mensuelle de référence 1971–2000 de la température maximale
Janvier – France

4°C à Strasbourg
6°C à Lyon, Paris, Lille
9°C à Toulouse
Aussi doux vers Biarritz
qu'en Méditerranée !

Tn juillet

Moyenne mensuelle de référence 1971–2000 de la température minimale
Juillet – France

Effet urbain parisien
Plus de 18°C en Médit !

Tx juillet

Moyenne mensuelle de référence 1971–2000 de la température maximale
Juillet – France

20°C à Brest et Cherbourg
22°C à Lille
24-25°C à Nantes, Paris, Strasbourg
28°C à Toulouse
30°C dans l'intérieur du SE

Nb jours avec gelée

Nombre moyen annuel de jours avec gelée sous abri
Moyennes 1971-2000

- 0,5 jour au Cap Corse, Ile Rousse, Cap Pertusato
- 1,3 jours à Nice
- 2 jours à Bastia (et Ouessant)
- 23 jours à Marignane
- 25 jours à Paris (47 à Trappes)
- 33 jours à Toulouse
- 50 jours à Mont de Marsan
- 52 jours à Aix en Provence
- 53 jours à Lyon
- 69 jours à Strasbourg
- 73 jours à Romorantin
- 91 jours à Luxeuil !

Nb jours de chaleur ($T_x > 25^\circ\text{C}$)

Nombre moyen annuel de jours avec température maximale $\geq 25^\circ\text{C}$
Moyennes 1971-2000

- 10 jours à Brest
- 26 jours à Lille
- 43 jours à Paris (34 à Trappes)
- 51 jours à Strasbourg
- 67 jours à Lyon
- 75 jours à Nice
- 79 jours à Toulouse
- 103 jours à Marignane
- 119 jours au Luc

Nb jours de forte chaleur ($T_x > 30^\circ\text{C}$)

Nombre moyen annuel de jours avec température maximale $\geq 30^\circ\text{C}$
Moyennes 1971-2000

- 1 jour à Brest
- 5 jours à Lille et à Nice
- 9 jours à Paris (6 à Trappes)
- 11 jours à Strasbourg
- 19 jours à Lyon
- 24 jours à Toulouse
- 33 jours à Marignane
- 52 jours au Luc
- 69 jours à Conqueyrac (1991-2000)

Vagues de chaleur

Il faut néanmoins ajouter l'été 1947 avec 3 périodes caniculaires (dont une forte pendant 13 jours)

Vagues de chaleur en France

Période 1950-2009

Le diamètre des sphères symbolise l'intensité globale des vagues de chaleur, les sphères les plus grandes correspondant aux vagues de chaleur les plus sévères

Records absolus Tn_x

période 1950-2009

Records absolus T_{x_x}

période 1950-2009

Vagues de froid

Vagues de froid en France

Période 1947-2012

METEO FRANCE
Toujours un temps d'avance

Le diamètre des sphères symbolise l'intensité globale des vagues de froid, les sphères les plus grandes correspondant aux vagues de froid les plus sévères

températures

Compléments : vagues de froid

précipitations

RR janvier

Précipitations en Janvier en mm (1 mm=1l/m²)
Moyennes 1971-2000

Plaines du Massif Central et Alsace sont en retrait : foehn par perturbations d'ouest

RR mai

Précipitations en Mai en mm (1 mm=1l/m²)
Moyennes 1971-2000

L'évolution diurne devient importante + effet continental = beaucoup de RR dans l'intérieur (max annuel à Toulouse par exemple)

RR juillet

Précipitations en Juillet en mm (1 mm=1l/m²)
Moyennes 1971-2000

Humide seulement dans le NE par effet continental.
Sécheresse en Méditerranée

RR septembre

Précipitations en Septembre en mm (1mm=1l/m²)
Moyennes 1971-2000

Fortes RR vers les Cévennes et dans le SE en proportion, même si le signal ne ressort pas sur le Languedoc Roussillon

Nb jours avec RR > 1 mm

Moyenne mensuelle de référence 1971–2000 du nombre de jours avec RR >= 1mm

France

Vive la Méditerranée !
Pays Basque,
Bretagne, Normandie,
reliefs de l'est sont
bien touchés...

précipitations

Compléments : fortes RR (en Méditerranée)

Un site (pluies extrêmes) :
<http://pluiesextremes.meteo.fr/>

Episodes récents les plus marquants

- **Var, 15 juin 2010**, en 24 heures :
 - 397 mm aux Arcs, 304 mm à Comps sur Artuby
 - 25 morts
 - 300 habitations détruites, 200 000 personnes privées de courant
- **Gard, septembre 2002**, en 48 heures :
 - 687 mm à Anduze, 635 mm à St Christol-les-Alès
 - 20 morts
 - 1 département concerné
- **Aude, novembre 1999**, en 36 heures :
 - 624 mm à Lézignan-Corbières (dont 229 mm en 3 heures)
 - 4 départements touchés
 - + de 30 morts
- **Vaison-la-Romaine, septembre 1992**, en 4 heures :
 - 300 mm à Entrechaux
 - 1 cellule orageuse quasi-stationnaire
 - 1 fraction de département concernée
 - 34 morts

Nombre d'épisodes - période 1979 - 2008

RR24 :

> 200 mm

> 300 mm

Localisation des épisodes > 200 mm

NB de cas de RR en 24 H ≥ 200 mm

Postes ouverts sur une période de 20 ans (1989 – 2008) – (mise à jour du 12/02/2009)

Répartition mensuelle – 1958 - 2000

nb épisodes > 200 mm

Variabilité interannuelle

- **Forte variabilité interannuelle**

- ✓ 9 cas en 1977

- ✓ 1 cas en 1978

- ✓ 8 cas en 1997

- ✓ 2 cas en 1998

Évolution occurrences 1958 - 2008

Nombre annuel de jours avec une hauteur de pluie $\geq 100, 150$ ou 190 mm en 24 h sur les régions méditerranéennes de la France. (Période 1958-2008)

neige

Nombre de jours avec chute de neige

Moyennes 1951-1980

Météo de la France

Jacques Kessler & André Chambraud

vent

Nb jours avec vent fort (16 m/s)

Nombre moyen annuel de jours avec vent maximal instantané ≥ 16 m/s
Moyennes 1981-2000

Régions les plus ventées : sans surprise, on retrouve les régions du NO, ainsi que les régions méditerranéennes (surtout le secteur de la Tramontane)

Régions les moins ventées : le SO (hors secteur de l'Autan), l'Allier, le sud de la Corse

Nb jours avec vent très fort (25 m/s)

Nombre moyen annuel de jours avec vent maximal instantané ≥ 25 m/s
Moyennes 1981-2000

Régions les plus ventées : les régions méditerranéennes (surtout le secteur de la Tramontane) sont largement en tête. On retrouve aussi la pointe bretonne et Belle Ile

Régions les moins ventées : le SO (hors secteur de l'Autan), l'Anjou, la Bourgogne, la Lorraine, l'arrière pays provençal, le sud de la Corse

Nb jours avec vent tempétueux

Il manque de nombreuses stations pour pouvoir faire des comparaisons pertinentes

Tempêtes

Tempêtes remarquables depuis 1980

Estimation de la superficie touchée par les vents forts

insolation

Cumul annuel de la durée d'insolation

Cumul moyen annuel de la durée d'insolation
Moyennes 1991-2000

Heures

160 km

Régions les plus ensoleillées : la Provence et l'O Corse (pourquoi ?) + façade atlantique

Régions les moins ensoleillées : intérieur de la Bretagne, Cotentin, Ardennes, et par rapport à l'environnement, la Gascogne.

Insolation moyenne en janvier

Régions les plus ensoleillées : le SE

Régions les moins ensoleillées : N de la Seine + Normandie

Moyennes 1951-1980

Météo de la France

Jacques Kessler & André Chambraud

Insolation moyenne en juillet

Régions les plus ensoleillées : le SE + façade atlantique

Régions les moins ensoleillées : Nord, Picardie, Ardennes, intérieur Bretagne, Pays Basque et Piémont des Pyrénées

Moyennes 1951-1980

Météo de la France

Jacques Kessler & André Chambrud

orage

Les orages

LE RESEAU FOUDRE NATIONAL DENSITE MOYENNE ANNUELLE D'IMPACTS DE FOUDRE AU SOL

Période :
01/01/1997 - 31/12/2008

Nb d'impacts par km²
(en centièmes d'impacts)

Maille :
10 km X 10 km

METEO FRANCE
Toujours un temps d'avance

DSO/CMR/Foudre
Janvier 2009

Les orages

Une grande variabilité suivant les saisons :

- Été : saison la plus orageuse
- Hiver : saison la moins orageuse
- Automne : saison la plus orageuse dans le SE
- **Printemps : saison très orageuse dans les terres**

Les orages

Nombre de jours par an avec orage

Jours où l'on entend gronder le tonnerre, sans qu'il soit nécessairement accompagné de pluie

Moyennes 1951-1980

Météo de la France
Jacques Kessler & André Chambraud

La grêle

plus de 5 jours

Nombre de jours par an avec chute de grêle

Moyennes 1951-1980

*Météo de la France
Jacques Kessler & André Chambraud*

brouillard

Climatologie du brouillard

- Régions les plus concernées :
 - Aquitaine (Landes)
 - Bourgogne (Morvan)
 - Vosges (dpt)
 - Intérieur du NO (Bretagne, Normandie, Picardie, Nord Pas de Calais)
- Régions les moins concernées :
 - Le littoral (en général)
 - La Méditerranée
 - Plaines du Massif Central, des Alpes et des Pyrénées
 - Paris et la petite couronne

Moyennes 1951-1980

*Météo de la France
Jacques Kessler & André Chambraud*

Quelques liens

Sitographie

- Site climat de Météo France :
 - <http://climat.meteofrance.com/>
- Réanalyses GFS
 - <http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsreaeur.html>
 - <http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsrea2eur.html>
- Site pluies extrêmes
 - <http://pluiesextremes.meteo.fr/>

Phénomènes locaux

Introduction - Notion d'échelle

méso-échelle

échelle aérologique

échelle synoptique

Introduction - Notion d'échelle

Quelques ordres de grandeur :

- Échelle aérologique :
 - de l'ordre de 10 km
 - quelques heures
 - ex : Cb isolé

- Mésos-échelle :
 - de l'ordre de 100 km
 - quelques dizaines d'heures
 - ex : convection organisée, vent d'autan

- Échelle synoptique :
 - de l'ordre de 1000 km
 - quelques jours
 - ex : une perturbation

Influence du relief sur l'écoulement

Influence du relief sur l'écoulement

- Effet venturi (vents locaux)

- Effets nuages (Franchissement ou contournement)
 - Ondes orographiques
 - Effet de fœhn
 - Blocage orographique
 - Convergence sous le vent d'un relief

Effet Venturi

quand la section diminue la vitesse augmente

Sirocco en Sicile

Ex : Vallée du Rhône, bouches de Bonifacio,
Gibraltar, détroit du Pas de Calais...

Effet de falaise: Vent majoritairement normal à la falaise

Coupe dans le plan vertical

Roses des vents

Carte annuelle période 1981-1990

Influence de la topographie autour de la Méditerranée

En observant les vents supérieurs à 20 KT on met en évidence les vents régionaux

Mistral

Tramontane

Situation du 07/11/99 à 12 h UTC vents supérieurs à 20 nd (37 km/h)

Conclusion

Des vents locaux souvent conséquences de l'orographie

Effet de foehn

Au bout d'un temps,
l'air arrive à saturation :
Il condense
Un nuage se forme
Des pluies peuvent
débuter

Après avoir franchi le
relief, l'air redescend :
Il dé-sature
Et poursuit sa descente

L'air s'élève :
Il garde son contenu en eau
Il se refroidit
> Il s'humidifie

Effet de foehn

Gradient adiabatique
humide : $-0,65^{\circ}\text{C}/100\text{m}$

Gradient adiabatique
sec : $1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$

Gradient adiabatique
sec : $-1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$

Effets orographiques

Air stable

Air instable

Survitesse à la crête

Vent faible

Vent modéré

Vent assez fort / fort

Les ondes se forment si vent proche de la perpendiculaire au relief, par air stable et vent suffisamment fort qui se renforce avec l'altitude.

Effets orographiques

Effet sensible jusqu'à dix fois la hauteur de l'obstacle

Effet de foehn

Foehn d'un côté, mais blocage orographique de l'autre !

Que remarquez-vous ?

Image visible
09/03/2009 à 15 UTC

Foehn d'un côté, mais blocage orographique de l'autre !

Illustrations effet de foehn

Influence de la nature des sols

3. Influence de la nature des sols

- Chauffage différentiel
 - Effets de brises
 - Îlot de chaleur urbain
 - Exemple des Landes
 - Effet de cuvette (développé jeudi)

Les brises marines

Quand les températures sont égales, isothermes et isobares sont horizontales. Il n'y a pas de brise.

Les brises marines

Avec le chauffage du soleil,
l'air chaud va avoir tendance
à s'élever au dessus de la
Terre. C'est le contraire sur
mer

Les brises marines

- La boucle de brise est asymétrique
- La brise de mer « pure » rentre du large

Les brises marines

La nuit le phénomène s'inverse :

- La boucle de brise nocturne est moindre que la diurne (moins épaisse ; s'étend moins vers le large)

Les brises marines

Qu'appelle-t-on front de brise ?

Le front de brise est une zone de convergence qui se forme en général en mer en cours de matinée (resp. nuit) lorsque la brise de terre (resp. mer) devient très faible. Cette zone de calme se déplace vers la côte (resp. large), poussée par la brise de mer (resp. terre) qui s'établit; elle sépare par un calme deux zones de vents sensiblement opposés.

Les brises marines

Front de brise

tant sur le nord-ouest de la France, que sur le sud-est de la Grande-Bretagne et le Cotentin.

Les brises marines

NOAA14-88/87/97-1483 UTC: BRISE SUR LES COTES DE LA MANCHE

Les brises marines

- Limite : les schémas précédents sont intéressants, mais n'expliquent pas un fait expérimental :

Et pourtant elle tourne! La brise...

- Pour les causes expliquées précédemment :
 - Le vent naît et se renforce
 - La force de Coriolis agit (si durée suffisante et domaine spatial suffisant)
 - Le vent devrait donc tourner sur sa droite dans l'hémisphère nord
- On arrive ainsi au cas de la brise pure où le vent décrit un 360° en 24 heures (avec deux calmes)
- Pourtant, la brise suit le plus souvent le moindre effort

Les brises de pente et les brises de vallées

Les brises thermiques montantes (respectivement descendantes) sont généralement rangées en 2 catégories :

- Les brises dites “de pente” qui se réalisent à l’échelle d’une pente
- Les brises dites “de vallée” à l’échelle d’une vallée ou d’un massif montagneux

Les brises de pente

Dans la journée, par suite de l'ensoleillement, sous l'effet de la flottabilité, l'air s'anime vers le haut

Si les pertes radiatives ne sont pas compensées le long des pentes, sous l'effet de la flottabilité, l'air s'anime vers le bas

Les brises de vallée

L'air s'anime sous l'effet du gradient horizontal de pression qui se met en place entre l'amont et l'aval d'une vallée.

Illustrations effet de brise

Illustrations nature des sols

Îlot de chaleur urbain

Landes

Autres exemples

Influence de la nature des sols

13/05/2008

Des cumulus se développent sur les Landes, au dessus de l'air plus humide de la forêt. Le modèle Arôme le suggère parfaitement bien...

Nature des sols et évolution diurne

12/01/2009

Que remarquez-vous ?

Nature des sols et évolution diurne

12/01/2009

Au dessus de l'îlot de chaleur urbain toulousain, l'air est plus chaud et moins humide. Le brouillard peut se dissiper plus rapidement ...